

**Sovradosaggio:**

Non sono stati osservati segni clinici quando il prodotto è stato somministrato ai cavalli 5 volte (11 mg/kg) la dose raccomandata per 15 giorni, nei bovini 5 volte (15 mg/kg/giorno) le dosi raccomandate per 5 giorni, o nei suini per 3 volte (9 mg/kg/giorno) le dosi raccomandate per 3 giorni.

Ketoprofene può causare reazioni di ipersensibilità e inoltre potrebbe avere un effetto dannoso sulla mucosa gastrica. Questo può richiedere la cessazione del trattamento con ketoprofene e l'introduzione di una terapia sintomatica.

L'uso in animali con meno di 6 settimane o anziani può provocare rischi ulteriori.

Se tale uso non può essere evitato, gli animali possono richiedere un dosaggio ridotto e una gestione accurata.

Evitare iniezioni intraarteriose. Non eccedere nei dosaggi stabiliti e nella durata del trattamento.

Utilizzare con cautela negli animali disidratati, ipovolemici o con ipotensione in quanto vi è un potenziale rischio di aumento della tossicità renale. In caso di colica, una dose supplementare può essere somministrata solamente dopo attenta visita clinica.

Durante tutto il tempo del trattamento deve essere somministrata sufficiente acqua di abbeverata.

SPECIE	TEMPI DI ATTESA	INCOMPATIBILITA'	REGIME DI DISPENSAZIONE
<b>BOVINI</b>	Carni e visceri: 4 giorni Latte: 0 ore	Il prodotto non deve essere somministrato insieme ad altri FANS e glucocorticoidi prima che siano trascorse 24 ore. La contemporanea somministrazione di diuretici, medicinali nefrotossici ed anticoagulanti deve essere evitata. Ketoprofene si lega fortemente alle proteine plasmatiche, e può spiazzare o essere spiazzato da altri medicinali fortemente leganti, come gli anticoagulanti. Poiché il ketoprofene può inibire l'aggregazione piastrinica e causare ulcere gastrointestinali, non deve essere usato con altri medicinali che hanno lo stesso effetto farmacologico, per evitare reazioni avverse.	Ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.
<b>CAVALLI</b>	Carni e visceri: 4 giorni Latte: uso non autorizzato in animali che producono latte per il consumo umano		
<b>SUINI</b>	Carni e visceri: 4 giorni		