

AVVERTENZE DI SICUREZZA PER L'OPERATORE:

L'iniezione di tilmicosina in esseri umani può risultare fatale, prestare la massima attenzione per evitare l'auto-iniezione accidentale e seguire scrupolosamente le istruzioni di somministrazione e le linee guida sotto indicate.

Questo prodotto deve essere somministrato solo da un veterinario. Non trasportare mai una siringa caricata con questo prodotto con l'ago inserito. L'ago deve essere inserito nella siringa solo al momento di riempire la siringa o di eseguire l'iniezione.

Mantenere siringa e ago separati in qualsiasi altro momento. Non utilizzare attrezzatura di iniezione automatica.

Assicurarsi che gli animali siano adeguatamente immobilizzati, compresi quelli che si trovano nelle vicinanze. Non lavorare da soli quando si usa questo prodotto.

In caso di auto-iniezione consultare immediatamente un medico e portare con sé il flacone o il foglietto illustrativo della confezione.

Applicare un impacco freddo (non direttamente il ghiaccio) sul sito dell'iniezione.

Sovradosaggio:

Nei bovini le iniezioni sottocutanee di 10, 30 e 50 mg/kg di p.c., ripetute tre volte a intervalli di 72 ore, non hanno provocato il decesso. Come previsto si è sviluppato un edema nel sito di iniezione. L'unica lesione osservata durante l'autopsia è stata una necrosi del miocardio nel gruppo trattato con 50 mg/kg di p.c. Dosi di 150 mg/kg di p.c. somministrate per via SC a intervalli di 72 ore hanno provocato il decesso. È stato osservato edema nel sito di iniezione e una leggera necrosi del miocardio è stata l'unica lesione rilevata durante l'autopsia. Altri sintomi osservati sono stati: difficoltà di movimento, scarso appetito e tachicardia.

Negli ovini singole iniezioni (circa 30 mg/kg di p.c.) possono causare un leggero aumento della frequenza respiratoria. Dosi più alte (150 mg/kg di p.c.) hanno causato atassia, letargia e incapacità di alzare la testa.

Il decesso è sopraggiunto dopo una singola iniezione EV di 5 mg/kg di p.c. nei bovini e di 7,5 mg/kg di p.c. negli ovini.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

Non somministrare per via endovenosa.

Non somministrare per via intramuscolare.

Non somministrare ad agnelli di peso inferiore ai 15 kg.

Non somministrare ai primati.

Non somministrare ai suini.

Non somministrare a cavalli e asini.

Non somministrare alle capre.

Non usare in caso di ipersensibilità al principio attivo o ad uno degli eccipienti.

Le sperimentazioni cliniche non hanno dimostrato una cura batteriologica negli ovini affetti da mastite acuta causata da *Staphylococcus aureus* e *Mycoplasma agalactiae*. Non somministrare ad agnelli di peso inferiore ai 15 kg in quanto vi è il rischio di tossicità da sovradosaggio.

Pesare accuratamente gli agnelli è importante per evitare un sovradosaggio. L'uso di siringhe da 2 ml o più piccole faciliterà un dosaggio accurato.

SPECIE	TEMPI DI ATTESA	INCOMPATIBILITA'	REGIME DI DISPENSAZIONE
BOVINI	Carni e visceri: 70 giorni Latte: 36 giorni	In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.	Ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.
OVINI	Carni e visceri: 42 giorni Latte: 18 giorni	Può essere somministrato soltanto da un veterinario.	