

DEXAMECINE

una scossa per riaccenderli



distribuito da:
Alivira Italia, s.r.l.
An Alivira Group Company
T +39 349 264 2910

C.so della Giovecca, 80
44121 Ferrara FE, Italia
customerservice@alivira.it

MATERIALE ESCLUSIVAMENTE
RISERVATO A MEDICI
VETERINARI E FARMACISTI.

Dexamecine

è indicato per il trattamento di infiammazioni e reazioni allergiche, nonché in tutti gli stadi di shock.

POSOLOGIE E VIE DI SOMMINISTRAZIONE

0,5 ml ogni 10 kg /PV pari a 0,1 mg/kg di desametasone per via intramuscolare.

POSOLOGIA ANTISHOCK

5/15 mg/kg pari a 0,25-0,75 mg/kg per via endovenosa

Generalmente è sufficiente un' unica somministrazione, nei casi più gravi si può ripetere la somministrazione dopo 2-3 ore. Dexamicine può essere utilizzato nei test di soppressione con desametasone.

Dosaggio: test a basse dosi di desametasone, eseguire un prelievo a t0(cortisolo basale) inoculare 0,01 mg/kg di desametasone (vista la bassa dose conviene diluire con soluzione fisiologica). Eseguire dopo 4 ore un prelievo post inoculazione del farmaco e ripetere un terzo prelievo dopo 8 ore.



ALIVIRA

distribuito da:
Alivira Italia, s.r.l.
An Alivira Group Company
T +39 349 264 2910

C.so della Giovecca, 80
44121 Ferrara FE, Italia
customerservice@alivira.it

MATERIALE ESCLUSIVAMENTE
RISERVATO A MEDICI
VETERINARI E FARMACISTI.